



	Pfizer (Comirnaty)	Moderna ³	Johnson & Johnson (J&J)
Edad elegible	Todos los mayores de 12 años	Todos los mayores de 18 años	Todos los mayores de 18 años
Serie primaria	Dos dosis con 21 días de diferencia	Dos dosis con 28 días de diferencia	Una dosis
Dosis adicional (tercera)^{1,2}	Quién: Recomendado si tiene un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado .		No se recomienda. Consulte la Dosis de refuerzo a continuación.
	Cuando: al menos 28 días después de su segunda dosis		
Dosis de refuerzo^{2,3} <i>Una dosis de refuerzo puede ser cualquier vacuna contra el COVID-19 (J&J, Pfizer o Moderna)</i>	Quién: Recomendado si es: <ul style="list-style-type: none"> Mayor de 65 años Tiene 18 años o más y vive en un centro de cuidado a largo plazo. Tiene entre 50 y 64 años y padece una condición médica o corre el riesgo de sufrir desigualdades sociales. Considere recibir si: <ul style="list-style-type: none"> Tiene entre 18 y 49 años y tiene una condición médica Tiene entre 18 y 64 años y tiene un mayor riesgo de exposición debido a su ambiente laboral o institucional; esto incluye a todos los trabajadores esenciales. Tiene un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado y ya ha recibido su tercera dosis. 		Quién: Recomendado para todos los que recibieron J&J para su serie principal. Esto incluye si está inmunodeprimido.
	Cuando: al menos 6 meses después de su segunda dosis ⁴ .		

1 Dosis adicionales: Los CDC recomiendan que las personas que tienen un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado que recibieron una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) como serie primaria reciban una (tercera) dosis adicional. Esto incluye a las personas que:

- Han estado recibiendo algún tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre
- Han recibido un trasplante de órgano y están tomando medicamentos inmunosupresores
- Han recibido un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos inmunosupresores
- Tienen inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Tienen una infección avanzada o no tratada por el VIH
- Están bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria

La dosis adicional debería ser la misma vacuna contra el COVID-19 que recibió para su serie primaria. Hable con su médico sobre si necesita recibir una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 y pregunte cuál es el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual. *Nota:* si está inmunodeprimido y recibió la vacuna J&J para su serie primaria, debería recibir una segunda dosis (dosis de refuerzo).

2 Las dosis de la vacuna Moderna vanean. La serie inicial y la dosis adicional (tercera) son una dosis completa. El refuerzo es una media dosis.

3 Dosis de refuerzo. Puede elegir qué vacuna recibirá como dosis de refuerzo. Puede ser una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer, Moderna o J&J. Hable con su médico si tiene preguntas sobre los riesgos y beneficios de un refuerzo o sobre qué vacuna recibir como refuerzo.

4 Si está inmunodeprimido, esto será 6 meses después de su (tercera) dosis adicional.

Para obtener más información, consulte [Dosis para inmunodeprimidos](#) y [Dosis de refuerzo](#).